

# **ARES SARDEGNA**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
a tempo indeterminato di n. 57 posti di  
Operatore Socio Sanitario, Cat. BS**

## **SESSIONE 3 - PROVA 01**



- 
- G00001**
- 1** **Iniziata la somministrazione di un pasto, il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata. Cosa deve fare l'OSS in questa situazione?**
- A** Sospendere l'alimentazione del paziente e avvisare l'infermiere
  - B** Continuare ad alimentare il paziente ma con cibi frullati e registrare l'episodio, segnalandolo all'infermiere
  - C** Far assumere alla persona una posizione più comoda, attendere qualche minuto e poi continuare ad alimentarla
  - D** Non dare alla persona cibi liquidi ma proseguire con la sola somministrazione di cibi solidi
- 
- G00002**
- 2** **Quali sono i mezzi comunemente utilizzati per la somministrazione dell'ossigeno?**
- A** Occhialini, cateteri e maschere
  - B** Solo occhialini monouso
  - C** Solo maschera standard
  - D** Cannula di Guedel, maschera standard
- 
- G00003**
- 3** **Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quale delle seguenti azioni è errato compiere durante il rifacimento del letto?**
- A** Scuotere la biancheria sporca per rimuovere i residui in essa contenuti
  - B** Tenere la biancheria sporca lontana dalla divisa
  - C** Evitare di appoggiare la biancheria riutilizzabile sopra il letto di un altro degente
  - D** Se possibile, arieggiare il locale durante il rifacimento del letto
- 
- G00004**
- 4** **Quale tra i seguenti è un fattore di rischio per lo sviluppo di lesioni cutanee?**
- A** Incontinenza fecale
  - B** Ipertensione arteriosa
  - C** Cefalea
  - D** Miopia
- 
- G00005**
- 5** **La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:**
- A** posizionato sul fianco
  - B** in posizione prona
  - C** in posizione supina
  - D** in posizione Fowler
- 
- G00006**
- 6** **Quale fra le seguenti manovre è indicata per prevenire lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie nel paziente portatore di catetere vescicale?**
- A** Utilizzare un sacchetto di raccolta sterile, munito di apposita valvola per lo svuotamento
  - B** A ogni svuotamento del sacchetto di raccolta, disconnettere il circuito e lavare l'interno del sacchetto con acqua distillata sterile
  - C** Non svuotare mai il sacchetto di raccolta, ma sostituirlo con uno nuovo ogni volta che si riempie
  - D** Utilizzare un sacchetto di raccolta pulito, a fondo chiuso e privo di valvole per evitare la contaminazione della parte interna
-

- 
- 7 G00007  
**Secondo le linee guida nell'ostruzione completa delle vie aeree da corpo estraneo la manovra di Heimlich viene eseguita:**
- A** paziente ancora cosciente, dopo esecuzione di 5 colpi interscapolari
  - B** paziente privo di coscienza
  - C** paziente supino
  - D** immediatamente
- 
- 8 G00008  
**Le cause più frequenti di disidratazione del bambino piccolo sono:**
- A** il vomito e la diarrea
  - B** le emorragie
  - C** le ustioni
  - D** i traumi
- 
- 9 G00009  
**Sia nell'igiene che nell'asciugatura dei piedi, a cosa deve porre attenzione l'operatore sociosanitario?**
- A** Agli spazi interdigitali, per evitare la proliferazione di microrganismi e fessurazioni tra un dito e un altro
  - B** Al dorso, per evitare la proliferazione di microrganismi e fessurazioni
  - C** Alla pianta del piede, per evitare la proliferazione di microrganismi e lesioni
  - D** Al tallone, per evitare la proliferazione di microrganismi e screpolature
- 
- 10 G00010  
**Quali sono le modalità di conservazione del materiale sterile?**
- A** In ambienti asciutti e puliti, al riparo della polvere con accesso limitato e a temperature comprese tra i 18 e 22 °C e a un tasso di umidità compresa tra 35 e 50 %, armadi puliti e chiusi
  - B** In ambienti asciutti, al riparo della polvere con accesso limitato e a temperature comprese tra i 10 e 16 °C e a un tasso di umidità compresa tra 35 e 55 % armadietti
  - C** In scaffali aperti, al riparo dalla luce diretta e dalla polvere a temperatura non superiore ai 9°C
  - D** In buste trasparenti datate e firmate dall'operatore riposte in scaffali a vista, fissati al muro
- 
- 11 G00011  
**Quando si utilizzano sostanze chimiche non è opportuno:**
- A** utilizzare il prodotto chimico senza protezioni
  - B** conservare il prodotto secondo le modalità prescritte dal produttore
  - C** lavare le mani dopo l'utilizzo del prodotto
  - D** adoperare il prodotto secondo le indicazioni del produttore
- 
- 12 G00012  
**Un'emorragia arteriosa si distingue perché:**
- A** il sangue color rosso vivo fuoriesce sincrono al polso
  - B** il sangue di colorito scuro fuoriesce lento
  - C** il sangue di colorito rosso acceso fuoriesce lentamente
  - D** il sangue di colorito scuro fuoriesce lentamente
-

13 **Nella dieta a basso contenuto di scorie si deve non assumere:**

- A** verdura, frutta fresca e legumi
- B** carne e yogurt
- C** fritti e bolliti
- D** pesce e bresaola

14 **I rifiuti provenienti dal Laboratorio Analisi e dalla Radiologia (reagenti, solventi, oli, lampade fluorescenti, batterie, sono compresi tra i:**

- A** rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- B** rifiuti sanitari non pericolosi
- C** rifiuti sanitari assimilabili agli urbani
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

15 **Durante l'epistassi come manovra di primo soccorso occorre:**

- A** abbassare il capo e stringere le narici
- B** sollevare il capo e bagnare la fronte con acqua fredda
- C** tamponare le narici con piccoli batuffoli di cotone idrofilo
- D** posizionare la borsa del ghiaccio

16 **La catena della sopravvivenza nelle fasi del BLSD secondo le LG IRC 2021 prevede:**

- A** riconoscimento e allarme precoce – RCP - defibrillazione precoce -intervento precoce del soccorso avanzato
- B** chiamare il 118/112 – RCP - defibrillazione precoce - intervento precoce del soccorso avanzato
- C** riconoscimento – RCP precoce - defibrillazione precoce - allarme precoce - intervento precoce del soccorso avanzato
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

17 **Nell'ostruzione parziale delle vie aeree da corpo estraneo, il paziente:**

- A** parla, tossisce, respira
- B** parla, non respira
- C** non riesce a tossire
- D** perde coscienza

18 **Durante l'attività di mobilitazione, l'OSS deve:**

- A** coinvolgere il paziente cercando di stimolare l'autonomia residua
- B** eseguire manovre decise, anche se causano dolore al paziente
- C** eseguire trazioni intense sugli arti e sulle articolazioni per aiutare il paziente a sollevarsi dal letto
- D** stirare bene le articolazioni muscolo-tendinee e le articolazioni immobili, anche se la manovra causa dolore al paziente

